






















扁桃摘出術を受けられる保護者の方へ

	入院/手術前日	手術当日(前)	手術当日(後)	手術後1日目～5日目	手術後6日目(退院日)
	/	/	/	/	/
診察 説明	・入院. 手術に向けての説明を行います(医師・看護師) ・麻酔科医. 手術室看護師の術前説明があります		・手術後より酸素吸入を行います	・診察. 処置を行います 	・朝の診察後退院となります
点滴 注射		・手術前に点滴を行います	・持続的に点滴を行います	・術後3日目まで朝. 夕抗生物質の点滴を行います ・術後4日目からは抗生剤の内服薬が処方されます	
行動	・病院内の行動は自由です	・病院内の行動は自由です	・術後4時間はベッド上で安静にして下さい。4時間後以降はトイレ歩行のみ可能です。	・病院内の行動は自由です	
清潔	・アズノール液でうがいをます(起床時・毎食後・就寝前)	・手術の服に着替えます		・傷の回復促進と炎症を抑えるためにアズノール液でくちゅくちゅうがいを行って下さい。 1日3回 ・清拭か希望あればシャワーできます 	・出血しやすくなるために、お風呂は医師に確認して下さい ・退院後はアズノール液でうがいしてください
排泄			・術後4時間より、麻酔からしっかり覚めたら、トイレのみ歩行はできます ・トイレ歩行時は気をつけてください		<b>本日退院です</b>
食事		絶食絶飲は、麻酔科医の指示に従ってください	・手術後は4時間以上して水分を飲んでいただいて結構です。その際は看護師におたずね下さい	・食事は流動食からはじめ、状態や希望に応じて変えていきます	・創が治るまでは硬いものを避け軟らかいものを食べて下さい(創が治るまではだいたい3週間かかります)
説明 指導			・えへんと咳払いをすると出血しやすくなりますので注意して下さい ・ <b>出血したら</b> すぐに申し出て下さい		

へんとうせん の しゅじゅつ でにゅういんの( )さま

にゅういん から たいいん までの せいかつ

	1にちめ		2にちめ		3にちめ	4・5にちめ	6・7にちめ	8にちめ
ひにち	にゅういん		しゅじゅつまえ	しゅじゅつご	しゅじゅつご1にち	しゅじゅつご2・3にち	しゅじゅつご4・5にち	たいいん
けんさ				 おしっこけんさ				
くすり			てんてき 			のみぐすり 		
				くすりでうがい。ガラガラうがいはしないでください				
すごしかた	じゆう		ベッドのうえですごす		じゆう			
といれ			といれ・おまる					
ごはん	ふつうのごはん		しゅじゅつご4じかんは、のめません		やわらかいごはん	いたくなければ、ふつうのごはん		
おふろ	おふろ 	しゅじゅつのおふろにきがえ			からだをふく		シャワー 	
せんせい	しゅじゅつのはなし			ちがでたら、のみこまないとはい	うがい・ごはんのせつめい			しんさつ 
かんごし	にゅういんせいかつのはなし			ちがでたら、のみこまないとはい	うがい・ごはんのせつめい			いえでのせいかつについてせつめい 
やくざいし						くすりのせつめい		