







《大腸》

術後通院スケジュール

手術日:  
退院時体重:

		退院後2週間まで	H 年 月 日(術後3ヶ月)ま	H 年 月 日(術後6ヶ月)まで	H 年 月 日(術後9ヶ月)ま	H 年 月 日(術後1年)まで	H 年 月 日(術後2年)まで	H 年 月 日(術後5年)まで
通院間隔	かかりつけ医 安佐市民病院	週に一回 ○	最低2~4週間に1回程度 ○	最低3ヶ月に1回程度 ○	最低3ヶ月に1回程度 ○	最低3ヶ月に1回程度 ○	最低3ヶ月に1回程度 ○(1年に1回)	最低3~6ヶ月に1回程度 ○(1年に1回)
通院目標		きちんと受診する 食事が取れる 退院時に比べて2Kg以上の体重減少がない 吐かない 37度以上の熱がない 傷の感染が無い 痛みがない	きちんと受診する 食事が取れる 5Kg以上の体重減少がない	きちんと受診する 食事が取れる 5Kg以上の体重減少がない	きちんと受診する 食事が取れる 5Kg以上の体重減少がない	きちんと受診する 食事が取れる 5Kg以上の体重減少がない	きちんと受診する 食事が取れる	きちんと受診する 食事が取れる
病院で調べる項目		食事量 体重 体温 創の状態	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
病院で受ける検査		血液検査 検尿 CT(胸部、腹部、骨盤部)	○ ○ ○	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 術後半年目	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 6ヶ月に1回	6ヶ月に1回 6ヶ月に1回 6ヶ月に1回
		大腸内視鏡				術後1年目(安佐市民病院受診後に予約を取ってください)	1~2年に1回(安佐市民病院受診後に予約を取ってください)	1~2年に1回(安佐市民病院受診後に予約を取ってください)
病院で受ける治療	 	くすり 点滴	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらって下さい	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらって下さい	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらって下さい	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらって下さい	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらって下さい	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらって下さい
調子が悪い場合		創から膿が出ている場合は安佐市民病院を紹介してもらってください 吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。

受診された事を2年目までは3ヵ月毎にそれ以降は半年毎に安佐市民病院にファックスします