

レジメン	ベバシズマブ+XELOX療法																			期間	21日間		
薬品名	標準投与量	投与時間	day																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジフェンヒドラミン錠	10mg 5錠	オキサリプラチン投与 30分前																					
アプレピタントカプセル125mg		オキサリプラチン 1時間以上前																					
アプレピタントカプセル80mg		朝食後:1個																					
ベバシズマブ注 /生食100mL	7.5mg/kg	初回 90分 2回目 60分 3回目~ 30分																					
パロノセトロン注 デキサメタゾン注		30分																					
オキサリプラチン注 デキサメタゾン注 /5%ブドウ糖液500mL	130mg/m ²	2時間																					
5%ブドウ糖液100mL		全開																					
カペシタビン錠300mg		朝夕内服 (初日は夕から)																					
詳細	カペシタビン用法・用量																						
	体表面積		初回基準量																				
	1. 36m2未満		1, 200mg/回を1日2回																				
	1. 36m2以上1. 66m2未満		1, 500mg/回を1日2回																				
	1. 66m2以上1. 96m2未満		1, 800mg/回を1日2回																				
1. 96m2以上		2, 100mg/回を1日2回																					