経皮的高周波カテーテル心筋燃灼術(カテーテルアブレーション)を受けられる(

主治医(

) 看護師(

)さま(通常用) 入院診療計画書

工心区(/ 1000	(
日付	/ ()	/	()	/ ()
経過	入院日	術前	術後	術後1日目
検査	心電図検査があります		心電図検査をします	
点滴		6時から点滴を始めます	圧迫除去まで点滴があります 点滴があります(帰室時)	
内服		6時に指示のお薬を内服してください		
処置	身長・体重・ウェスト・ヒップ測定をします 除毛があります 心電図モニターを装着します	検査着に着替えます	医師にて止血確認後、足の付け根の圧 迫をとります	心電図モニターを 除去します
安静度・リハビリ	院内制限はありません		圧迫除去までベッド上安静、穿刺側の 足の屈曲不可です 圧迫除去した後は、病棟内制限はあり ません	院内制限はありません
食事		起床後より飲食はできません 飲水はできます	術後からご飯再開です 圧迫中の場合は寝たまま食べられます	
清潔	シャワー浴ができます			
排泄		尿の管を入れます	圧迫除去後、尿の管を抜きます	
患者・家族への説 明	入院生活について説明があります 薬剤師による内服説明があります	<u> </u>	看護師による退院指導があります (の)	

広島市立北部医療センター安佐市民病院 2024年8月改訂