

広島安佐地区胃がんESD/EMR地域連携クリニカルパス 『胃がん/ESD後経過観察/内視鏡的根治度A』 Ver 3.0 2018.7.1作成 2022.5.1改訂	専門医施設退院時主治医氏名	広島市立北部医療センター安佐市民病院()
	連絡先	082-815-5211(内線:9059)
	連携医療機関名	
	連携医療機関連絡先	

患者氏名	生年月日	特記事項
------	------	------

治療時情報	手術日	令和 年 月 日	目標	局所・異所性再発がない/診療計画に沿って定期的な検査が行える
	既往歴		対象患者 適応条件	<input type="checkbox"/> 2cm以下のUL(-)の分化型M癌 <input type="checkbox"/> 2cmを超えるUL(-)の分化型M癌 <input type="checkbox"/> 3cm以下のUL (+) の分化型M癌 <input type="checkbox"/> 2cm以下のUL (-) 未分化型M癌
	発症部位			
	病理結果		パス開始日	令和 年 月 日
			パスの説明日と 同意日	令和 年 月 日
	<i>H. pylori</i> 除菌歴 (2000年以降)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	バリエンス	到達目標が達成されない場合
		癌治療連携 指導料算定	<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可	

手術後経過(術後期間)		2週間以内 H 年 月	8週間頃 H 年 月	3ヶ月後 H 年 月	6カ月後 H 年 月	1年後 H 年 月	2年後 H 年 月	3年後 H 年 月	4年後 H 年 月	5年後 H 年 月	以後 1回/年
専門 施設 医	治療	潰瘍治療薬内服 →									
	外来	○	○			○	○	○	○	○	→
	検査		○								
連携 医 施設 機 関	治療	<i>H. pylori</i> 除菌療法 一次除菌 (PPI+アモキシシリン+クラリスロマイシン : 3剤併用1週間) 二次除菌 (PPI+アモキシシリン+メロニダゾール : 3剤併用1週間) *2000年以降 <i>H. pylori</i> 除菌歴のある場合は、二次除菌を行う 除菌治療薬内服後、4週間以降に実施する。 除菌判定は、尿素呼吸試験(UBT)または便中 <i>H. pylori</i> 抗原測定が望ましい。									
	検査			○	○						
	<i>H. pylori</i> 陽性の 場合 上部消化管内視鏡検査*						○	○	○	○	○
備考	バリエンス発生時は連携医療機関より安佐市民病院地域医療連携室へ直接 FAX。TEL:082-815-5211(内線9059)、FAX:082-815-5691 *診療経過の共有は診療情報提供書を用いる。										

*内視鏡施設がない場合、当院の地域医療連携を通じてご紹介ください。

この内容は胃がん地域連携クリニカルパス・千葉胃がん地域連携研究会版の一部を改変し、利用させていただいております。