

(大腸)

- ・ 病理病期Ⅲ期大腸癌への術後化学療法率

(肺)

- ・ 臨床病期Ⅰ～Ⅱ期非小細胞肺癌への外科治療／定位放射線治療施行率
- ・ 術後病期Ⅱ、ⅢAの非小細胞肺癌への術後化学療法施行率
- ・ 腺癌患者に対する治療前の遺伝子変異検査
- ・ EGFR-TKI 剤による治療の前の遺伝子変異検査
- ・ 非小細胞肺癌に対するプラチナ製剤を含む二剤併用療法
- ・ 非小細胞肺癌に対する同時化学放射線療法
- ・ 小細胞肺癌に対する多剤併用化学療法小細胞肺癌に対する治療
- ・ 小細胞肺癌に対する多剤併用化学療法のコース数
- ・ 限局性小細胞肺癌に対する同時化学放射線療法
- ・ 限局型小細胞肺癌に対するシスプラチン+エトポシドを用いた化学療法
- ・ 静注化学療法施行中の定期検査
- ・ 大細胞癌の診断根拠

(乳腺)

- ・ 乳房温存術後の70歳以下患者への放射線治療施行率
- ・ 乳房切除後再発ハイリスクの乳癌患者への放射線療法施行率

(胃)

- ・ 胃癌術後病期Ⅱ/Ⅲへの化学療法の施行率
- ・ 内視鏡治療後の胃癌へのフォロー内視鏡施行率
- ・ 治療前内視鏡の色素/NBI 診断
- ・ 化学療法前のHER2 検査
- ・ トラスツズマブ使用前の心エコー検査
- ・ 内視鏡治療後在院日数
- ・ 内視鏡治療患者のピロリ検査
- ・ 臨床病期Ⅱ・Ⅲ胃癌患者への腹水細胞診
- ・ 外科手術後在院日数
- ・ 化学療法前の血液検査
- ・ 術後補助化学療法の開始時期
- ・ 切除不能進行胃癌患者への化学療法選択
- ・ 化学療法中の検査間隔：CT・MRI
- ・ 化学療法中の検査間隔：腫瘍マーカー
- ・ 切除不能進行胃癌への適切な体制による緩和ケア

(臓器横断)

- ・ 外来における麻薬治療開始時の緩下剤処方率
- ・ 嘔吐高リスク化学療法における予防的制吐剤処方率

(子宮頸癌)

- ・ CIN3 に対する子宮頸部円錐切除術
- ・ 上皮内腺癌に対する子宮全摘術
- ・ II 期の腺癌に対する治療
- ・ III・IVA 期に対する同時化学放射線療法
- ・ III・IVA 期に対する同時化学放射線療法のレジメン
- ・ III・IVA 期に対する主治療前の化学療法
- ・ IVB 期に対するプラチナ製剤を含む化学療法
- ・ 腫瘍浸潤度の検査
- ・ 小線源治療を用いた根治的放射線治療
- ・ 維持療法としての経口抗がん剤

(卵巣)

- ・ 術前化学療法前の組織診
- ・ 切除不能卵巣がん・化学療法前の組織診
- ・ 治療前の D ダイマーまたは下肢静脈エコー
- ・ 周術期の抗凝固剤の使用
- ・ 腹腔鏡手術後の追加開腹手術
- ・ II 期以上手術例に対する術後化学療法
- ・ 術後 6 か月以内のエストロゲン製剤の投与
- ・ 初回化学療法での TC 療法および dd-TC 療法
- ・ I, II 期への初回化学療法へのベバシズマブ併用
- ・ III, IV 期の初回化学療法へのベバシズマブ併用
- ・ III, IV 期の TC+Bev 療法後のベバシズマブの維持療法
- ・ 粘液性癌、明細胞癌への標準以外の化学療法
- ・ II 期以上の悪性胚細胞腫瘍への BEP 療法
- ・ カルボプラチン使用に際しての NK1 阻害剤使用
- ・ 初回手術における術中迅速診断
- ・ 境界悪性腫瘍への化学療法