




レジメン	HP療法																			期間	21日間		
薬品名	標準投与量	投与時間	day																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペルツズマブ注 /生食250mL	初回840mg 以後420mg	初回60分 2回目から30分																					
生食50mL		全開																					
トラスツズマブ注 /生食250mL	初回8mg/kg 以後6mg/kg	初回90分 2回目から30分																					
詳細																							

次ページ有り

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	...	21
自覚症状	心機能障害																					
		不整脈、息切れ、むくみなどの可能性があります。症状がある場合はお知らせ下さい。																				

次ページ有り

●観察が必要な、自覚症状を伴う副作用症状(CTCAE)			テレフォンフォロー時期の目安
心機能障害	Grade1	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	1サイクルに1回 程度
	Grade2	中等症; 非侵襲的治療を要する; 年齢相応の軽作業の制限	
	Grade3	重症だが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限	
	Grade4	生命を脅かす; 緊急処置を要する	

※がん薬物療法副作用管理マニュアル第2版,東京,医学書院,2021. がん化学療法ワークシート第5版,東京,じほう,2020. を参考に改変。