

(大腸)

- ・ 病理病期Ⅲ期大腸癌への術後化学療法率

(肺)

- ・ 臨床病期Ⅰ～Ⅱ期非小細胞肺癌への外科治療／定位放射線治療施行率
- ・ 術後病期Ⅱ、ⅢAの非小細胞肺癌への術後化学療法施行率
- ・ 腺癌患者に対する治療前の遺伝子変異検査
- ・ EGFR-TKI 剤による治療の前の遺伝子変異検査
- ・ 非小細胞肺癌に対するプラチナ製剤を含む二剤併用療法
- ・ 非小細胞肺癌に対する同時化学放射線療法
- ・ 小細胞肺癌に対する多剤併用化学療法小細胞肺癌に対する治療
- ・ 小細胞肺癌に対する多剤併用化学療法のコース数
- ・ 限局性小細胞肺癌に対する同時化学放射線療法
- ・ 限局型小細胞肺癌に対するシスプラチン+エトポシドを用いた化学療法
- ・ 静注化学療法施行中の定期検査
- ・ 大細胞癌の診断根拠

(乳腺)

- ・ 乳房温存術後の70歳以下患者への放射線治療施行率
- ・ 乳房切除後再発ハイリスクの乳癌患者への放射線療法施行率

(胃)

- ・ 胃癌術後病期Ⅱ/Ⅲへの化学療法の施行率
- ・ 内視鏡治療後の胃癌へのフォロー内視鏡施行率
- ・ 治療前内視鏡の色素/NBI 診断
- ・ 化学療法前のHER2 検査
- ・ トラスツズマブ使用前の心エコー検査
- ・ 内視鏡治療後在院日数
- ・ 内視鏡治療患者のピロリ検査
- ・ 臨床病期Ⅱ・Ⅲ胃癌患者への腹水細胞診
- ・ 外科手術後在院日数
- ・ 化学療法前の血液検査
- ・ 術後補助化学療法の開始時期
- ・ 切除不能進行胃癌患者への化学療法選択
- ・ 化学療法中の検査間隔：CT・MRI
- ・ 化学療法中の検査間隔：腫瘍マーカー
- ・ 切除不能進行胃癌への適切な体制による緩和ケア

(臓器横断)

- ・ 外来における麻薬治療開始時の緩下剤処方率
- ・ 嘔吐高リスク化学療法における予防的制吐剤処方率

(子宮頸癌)

- ・ CIN3 に対する子宮頸部円錐切除術
- ・ 上皮内腺癌に対する子宮全摘術
- ・ II 期の腺癌に対する治療
- ・ III・IVA 期に対する同時化学放射線療法
- ・ III・IVA 期に対する同時化学放射線療法のレジメン
- ・ III・IVA 期に対する主治療前の化学療法
- ・ IVB 期に対するプラチナ製剤を含む化学療法
- ・ 腫瘍浸潤度の検査
- ・ 小線源治療を用いた根治的放射線治療
- ・ 維持療法としての経口抗がん剤

(卵巣)

- ・ 術前化学療法前の組織診
- ・ 切除不能卵巣がん・化学療法前の組織診
- ・ 治療前の D ダイマーまたは下肢静脈エコー
- ・ 周術期の抗凝固剤の使用
- ・ 腹腔鏡手術後の追加開腹手術
- ・ II 期以上手術例に対する術後化学療法
- ・ 術後 6 か月以内のエストロゲン製剤の投与
- ・ 初回化学療法での TC 療法および dd-TC 療法
- ・ I, II 期への初回化学療法へのベバシズマブ併用
- ・ III, IV 期の初回化学療法へのベバシズマブ併用
- ・ III, IV 期の TC+Bev 療法後のベバシズマブの維持療法
- ・ 粘液性癌、明細胞癌への標準以外の化学療法
- ・ II 期以上の悪性胚細胞腫瘍への BEP 療法
- ・ カルボプラチン使用に際しての NK1 阻害剤使用
- ・ 初回手術における術中迅速診断
- ・ 境界悪性腫瘍への化学療法

(ゲノム)

- ・ dMMR の場合に免疫チェックポイント阻害薬が使用可能ながん種における MMR 検査
- ・ 子宮体がんにおける MMR 検査
- ・ 切除不能進行固形がんにおける CGP 検査
- ・ 18 歳未満の患者における CGP 検査
- ・ NTRK 融合遺伝子を高頻度に認めるがんにおける CGP 検査
- ・ CGP 検査後の遺伝カウンセリング
- ・ 入院中の CGP 検査