
【ハーセプチン＋Pembro+CAPOX療法】

1コース： 21日

薬品名	標準投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ /生食100mL	200mg	30分																					
生食50mL		最初10分間は同速で、その後全開																					
レスタミン錠　5錠		内服 エルプラット30分前																					
ハーセプチン/生食250mL	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回1.5時間 2回目～30分																					
デキサート注 /パロノセトロンバッグ		全開で																					
【L-OHP】エルプラット注 /ブドウ糖500mL・デキサート	130mg/㎡	2時間																					
5%ブドウ糖100mL		全開で																					
カペシタビン錠　1日2回朝夕		夕食後より内服	◀	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	▶						

治療による副作用

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
発熱																					
食欲不振・吐き気																					
脱毛																					
腎機能異常																					
下痢																					
白血球減少																					
ヘモグロビン減少																					
血小板減少																					
免疫関連有害事象																					



上の表は治療のスケジュールや副作用の発現時期のおおまかな目安を示したものです。
必ずこの通りになるとは限りません。
何か気になる症状がでたり、お聞きになりたいことがありましたら、気軽に医師・薬剤師・看護師にお尋ねください。