
【Zolbetuximab+FOLFOX6療法】(胃)

1コース： 14日

薬品名	標準投与量	投与時間
レスタミン錠　5錠		エルプラット 投与30分前
デキサート注 アロカリス注 /パロノセトロンバッグ		30分
【Zol】ビロイ注 /生食	初回800mg/㎡ 2回目以降400mg/㎡	2時間以上かけて
生食50mL		最初10分間は ビロイと同速度、 その後全開
5%ブドウ糖100mL		全開で
【OX】エルプラット注 /5%ブドウ糖250mL	85mg/㎡	2時間
【FOL】レボホリナート注 /5%ブドウ糖250mL	200mg/㎡	2時間 エルプラットと同時投与
【F】5-FU注 /生食50mL	400mg/㎡	5～7分
【F】5-FU注 /生食	2400mg/㎡	46時間



治療による副作用

発熱		20%前後
食欲不振・吐き気		65%程度
脱毛		20～30%
しびれ（末梢神経障害）		数%
下痢		40%程度
白血球減少		20～30%
ヘモグロビン減少		20～30%
血小板減少		50%程度



上の表は治療のスケジュールや副作用の発現時期のおおまかな目安を示したものです。
必ずこの通りになるとは限りません。
何か気になる症状がでたり、お聞きになりたいことがありましたら、気軽に医師・薬剤師・看護師にお尋ねください。