

# 必ずお読みください

## P E T - C T 検査の注意事項（患者様用）

P E T - C T 検査は検査の特性上、いくつかの制限があります。お守りいただけない場合は検査の結果に影響がある場合がありますので、ご了承くださいませ様よろしく願います。

### ①：検査前に絶食が必要です

P E T - C T 検査は全身のブドウ糖代謝をみる検査です。食事・血糖値の影響を強く受けま  
す。必ず、検査前6時間程度の絶食をお願いします。（糖分を含んだ飲料・ガム・飴なども**禁止**  
です。）飲水したい場合は、お水でお願いします。糖尿病などで絶食が難しい場合や、インスリン  
等を使用している場合は主治医とあらかじめご相談ください。また、下剤は前日から使用しない  
で下さい。糖類の含まれた点滴も絶食時間の間は禁止です。それ以外の薬に制限はありません。  
検査終了後は、普段通りの食事にかまいません。

また前日から当日検査を行うまではスポーツやジョギングなどの激しい運動は避けてくださ  
い。運動により検査結果に影響が出る場合があります。

### ②：検査予約時間に遅れないようにして下さい

この検査で使用する放射性同位元素を含んだ薬剤は、約2時間で半減し、1日経つとほぼ0になり  
ます。薬剤の使用可能時間に制限があるため、時間に間に合うように余裕を持って来院していただ  
くようお願いします。遅刻されますと、薬剤が使えなくなり、検査を行えない場合があります  
ので、ご了承ください。

検査を受けられる患者様の順番は、こちらで調節させていただきます。来院された順番で検査  
を行う訳ではありませんので、ご理解いただきます様よろしく願います。

### ③：高額な検査です

保険適用の3割負担で、検査代は3万円前後です。高額な検査であることをご了承ください。検  
査の延期やキャンセルは、前日の正午までに（月曜日に検査の方は金曜日までに）

安佐市民病院 放射線科までご連絡ください（082-815-5211 内線：9226 平日8：30～17：00）

### ④：検査時間について

受付から検査終了まで約3時間かかります。検査を受けられる患者様はその間、検査室から出る  
ことはできません。また、約20分の撮影中は少し狭い所（MR I 検査と同様）に入ります。閉所  
恐怖症のある方は主治医とご相談ください。また、検査中の安静に痛み止めが必要な方はご使用  
いただいてかまいません。付き添いの方は検査開始から、薬剤の注射後1時間までは付き添って  
いただきますよう願います。