












【胃】

術後通院スケジュール

手術日: H 年 月 日

退院時体重: Kg

		退院後2週間まで	術後3ヶ月まで	術後6ヶ月まで	術後9ヶ月まで	術後1年まで	術後2年まで	術後5年まで
通院間隔	かかりつけ医 安佐市民病院	週に一回	最低2~4週間に1回程度	最低3ヶ月に1回程度	最低3ヶ月に1回程度	最低3ヶ月に1回程度	最低3ヶ月に1回程度	最低3~6ヶ月に1回程度
通院目標		きちんと受診する 食事が取れる*	きちんと受診する 食事が出来る	きちんと受診する 食事が出来る	きちんと受診する 食事が出来る	きちんと受診する 食事が出来る	きちんと受診する	きちんと受診する
		退院時に比べて2Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない		
		吐かない						
		37度以上の熱がない						
		傷の感染がない						
		痛みがない						
病院で調べる項目	食事量 体重 体温 傷の状態	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
病院で受ける検査	血液検査 検尿 CT(胸部、腹部、骨盤部)	○ ○ ○	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 術後1年目	3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 6ヶ月に1回	6ヶ月に1回 6ヶ月に1回 6ヶ月に1回
								
	胃内視鏡					術後1年目	1~2年に1回(全摘を受けられた人は適宜)	1~2年に1回(全摘を受けられた人は適宜)
								
病院で受ける治療	くすり		あまり食べられない場合には栄養剤をもらってください	あまり食べられない場合には栄養剤をもらってください	あまり食べられない場合には栄養剤をもらってください	あまり食べられない場合には栄養剤をもらってください		
			食事の後に腹が張ったり胸焼けが強いときにはお薬をもらってください	食事の後に腹が張ったり胸焼けが強いときにはお薬をもらってください	食事の後に腹が張ったり胸焼けが強いときにはお薬をもらってください	食事の後に腹が張ったり胸焼けが強いときにはお薬をもらってください		
			貧血があれば鉄剤をもらってください	貧血があれば鉄剤をもらってください	貧血があれば鉄剤をもらってください	貧血があれば鉄剤をもらってください	貧血があれば鉄剤をもらってください	貧血があれば鉄剤をもらってください
	点滴	食事があまり取れない場合には点滴を受けてください	食事があまり取れない場合には点滴を受けてください	貧血の治療で注射が必要な事があります	貧血の治療で注射が必要な事があります	貧血の治療で注射が必要な事があります	貧血の治療で注射が必要な事があります	貧血の治療で注射が必要な事があります
			貧血の治療で注射が必要な事があります					
調子が悪い場合		創から膿が出ている場合は安佐市民病院を紹介してもらってください	食事が取れない場合かかりつけの先生に相談してお薬をもらってください。それでも上手く行かないときは安佐市民病院を紹介してもらってください	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。
		吐き気が強い時:腸を縫い合わせた所の一時的な腫れが先ず考えられます。この場合は点滴と軽めの食事で数日様子を見て良くならない時に安佐市民病院を紹介してもらってください。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。					
		吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は安佐市民病院に連絡下さい。						

受診された事を2年目までは3ヵ月毎にそれ以降は半年毎に安佐市民病院にファックスします