

《大腸》

術後通院スケジュール

手術日： 年 月 日

退院時体重： Kg

		退院後2週間まで	年 月 日(術後3ヶ月)まで	年 月 日(術後6ヶ月)まで	年 月 日(術後9ヶ月)まで	年 月 日(術後1年)まで	年 月 日(術後2年)まで	年 月 日(術後5年)まで
通院間隔	かかりつけ医	週に一回	最低2～4週間に1回程度	最低3ヶ月に1回程度	最低3ヶ月に1回程度	最低3ヶ月に1回程度	最低3ヶ月に1回程度	最低3～6ヶ月に1回程度
	北部医療センター安佐市民病院	○	○	○		○	○(1年に1回)	○(1年に1回)
通院目標 	きちんと受診する	きちんと受診する	きちんと受診する	きちんと受診する	きちんと受診する	きちんと受診する	きちんと受診する	きちんと受診する
	食事が取れる	食事が出来る	食事が出来る	食事が出来る	食事が出来る	食事が出来る		
	退院時に比べて2Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない	5Kg以上の体重減少がない		
	吐かない							
	37度以上の熱がない							
	傷の感染がない							
	痛みがない							
病院で調べる項目 	食事量	○	○	○	○	○	○	○
	体重	○	○	○	○	○	○	○
	体温	○						
	創の状態	○						
病院で受ける検査 	血液検査	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	検尿	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	CT(胸部、腹部、骨盤部)			術後半年目 		術後1年目 	6ヶ月に1回 	6ヶ月に1回 
	大腸内視鏡					術後1年目(北部医療センター安佐市民病院受診後に予約を取ってください)	1～2年に1回(北部医療センター安佐市民病院受診後に予約を取ってください)	1～2年に1回(北部医療センター安佐市民病院受診後に予約を取ってください)
病院で受ける治療 	くすり		腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらってください	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらってください	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらってください	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらってください	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらってください	腸が張ったり便通に異常があるときにはかかりつけの先生に相談してお薬をもらってください
	点滴 	食事があまり取れない場合には点滴を受けてください						
調子が悪い場合	創から膿が出ている場合は北部医療センター安佐市民病院を紹介してもらってください	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は北部医療センター安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は北部医療センター安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は北部医療センター安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は北部医療センター安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は北部医療センター安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は北部医療センター安佐市民病院に連絡下さい。	吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は北部医療センター安佐市民病院に連絡下さい。
		吐き気と共に“おなら”が出ないときは腸閉塞が疑われますので、直ぐにかかりつけ医に相談してください。夜間は北部医療センター安佐市民病院に連絡下さい。						

受診された事を2年目までは3ヵ月毎に、それ以降は半年毎に北部医療センター安佐市民病院にファックスします