

| レジメン | オビヌツズマブ-ベンダムスチン単独療法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 期間 | 28日間 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 薬品名 | 標準投与量 | 投与時間 | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... | 28 | | | | | | | |
| ジフェンヒドラミン10mg錠 3錠 イブプロフェン200mg錠 2錠 | | オビヌツズマブ投与 30分前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オビヌツズマブ注 /生食250mL | 1000mg/body | 徐々に 投与速度UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサメタゾン注 グラニセロン注 | | 全開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンダムスチン注 /生食250mL | 90mg/m ² | 1時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生食50mL | | 全開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 詳細 | (オビヌツズマブ) 1サイクル目は1, 8, 15日目, 2サイクル目以降は1日目に投与する。 維持療法では, 単独投与により2カ月に1回, 最長2年間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |