

【Dur+GC療法】(胆道癌)

1コース： 21日

薬品名	標準投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	･･･
【Dur】イミフィンジ1500mg /生食100mL	1500mg	60分																						
生食50mL		全開																						
ソルアセトF 500mL		90分																						
デキサート注/ パロノセトロンバッグ		全開																						
【CDDP】シスプラチン /生食500mL	25mg/㎡	90分																						
ソルアセトF 500mL		90分																						
【GEM】ゲムシタビン /5%ブドウ糖100mL	1000mg/㎡	30分																						

治療による副作用

食欲不振・吐き気																								
嘔吐																								
倦怠感																								
脱毛																								
infusion reaction																								
間質性肺炎																								
重症筋無力症																								
1型糖尿病																								
腎障害																								
皮膚障害																								
神経障害																								
血栓症																								
便秘・下痢																								
白血球減少																								
ヘモグロビン減少																								
血小板減少																								



上の表は治療のスケジュールや副作用の発現時期のおおまかな目安を示したものです。
必ずこの通りになるとは限りません。
何か気になる症状がでたり、お聞きになりたいことがありましたら、気軽に医師・薬剤師・看護師にお尋ねください。